

BULLETIN
du MUSÉUM NATIONAL
d'HISTOIRE NATURELLE

PUBLICATION BIMESTRIELLE

zoologie.

286

N° 409 SEPTEMBRE-OCTOBRE 1976

BULLETIN
du
MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE

57, rue Cuvier, 75005 Paris

Directeur : Pr M. VACHON.

Comité directeur : Prs J. DORST, C. LÉVI et R. LAFFITTE.

Rédacteur général : Dr M.-L. BAUCHOT.

Secrétaire de rédaction : M^{me} P. DUPÉRIER.

Conseiller pour l'illustration : Dr N. HALLÉ.

Le *Bulletin du Muséum national d'Histoire naturelle*, revue bimestrielle, paraît depuis 1895 et publie des travaux originaux relatifs aux diverses branches de la Science.

Les tomes 1 à 34 (1895-1928), constituant la 1^{re} série, et les tomes 35 à 42 (1929-1970), constituant la 2^e série, étaient formés de fascicules regroupant des articles divers.

A partir de 1971, le *Bulletin* 3^e série est divisé en six sections (Zoologie — Botanique — Sciences de la Terre — Sciences de l'Homme — Sciences physico-chimiques — Écologie générale) et les articles paraissent, en principe, par fascicules séparés.

S'adresser :

- pour les **échanges**, à la Bibliothèque centrale du Muséum national d'Histoire naturelle, 38, rue Geoffroy-Saint-Hilaire, 75005 Paris (C.C.P., Paris 9062-62) ;
- pour les **abonnements** et les **achats au numéro**, à la Librairie du Muséum, 36, rue Geoffroy-Saint-Hilaire, 75005 Paris (C.C.P., Paris 17591-12 — Crédit Lyonnais, agence Y-425) ;
- pour tout ce qui concerne la **rédaction**, au Secrétariat du *Bulletin*, 57, rue Cuvier, 75005 Paris.

Abonnements pour l'année 1976

ABONNEMENT GÉNÉRAL : France, 530 F ; Étranger, 580 F.

ZOOLOGIE : France, 410 F ; Étranger, 450 F.

SCIENCES DE LA TERRE : France, 110 F ; Étranger, 120 F.

BOTANIQUE : France, 80 F ; Étranger, 90 F.

ÉCOLOGIE GÉNÉRALE : France, 70 F ; Étranger, 80 F.

SCIENCES PHYSICO-CHIMIQUES : France, 25 F ; Étranger, 30 F.

International Standard Serial Number (ISSN) : 0027-4070.

Les Araignées des îles Mascareignes (îles Maurice, de La Réunion et Rodriguez)

par Roland LEGENDRE *

Résumé. — Liste par familles des 66 espèces d'Araignées signalées des îles Mascareignes (océan Indien).

Abstract. — A list of families is given for the 66 species of Spiders recorded from the Mascarene Islands (Indian Ocean).

Nous avons pu, grâce à l'amabilité de son Directeur, le Dr C. MICHEL, examiner les collections d'Araignées du Mauritius Institute où se trouvent regroupées les collections zoologiques nationales de l'île Maurice ; j'ai pensé qu'il serait souhaitable de comparer les données faunistiques de cette île avec celles de sa voisine immédiate, l'île de la Réunion ; malheureusement il ne semble pas exister l'homologue du Mauritius Institute dans cette île et les collections d'Araignées réunionnaises sont sporadiques et mal localisées ; en fait, la collection d'Auguste VINSON (qui fut le pionnier de l'arachnologie dans cette partie de l'océan Indien vers les années 1860-1870) semble avoir complètement disparu, car elle n'existe pas à la Réunion et ne se trouve pas non plus au Muséum national d'Histoire naturelle de Paris. Avec quelques collections personnelles fragmentaires et limitées à de grosses espèces (que j'ai pu réaliser au cours de trop brefs séjours à l'île Maurice (1959-1961-1964) et à l'île de la Réunion (1959, 1964)), ainsi qu'à partir de travaux de synthèse comme ceux de C. ROEWER (1942-1954) et P. BONNET (1945-1961), je vais tenter de donner un regroupement synthétique du peuplement aranéologique des îles Mascareignes.

Si l'on s'en tient aux chiffres bruts, on constate que pour les îles Mascareignes 66 espèces d'Araignées sont signalées et que sur ces 66 espèces moins de la moitié (21 espèces) se trouve également sur l'île Maurice et à la Réunion ; il y a donc là une apparente disparité de peuplement pour deux îles relativement proches et ayant un passé géologique commun d'îles volcaniques.

ORTHOGNATHES

Deux espèces de Mygales sont signalées de l'île Maurice alors qu'aucune espèce n'a, jusqu'ici, été répertoriée de la Réunion ; en fait, une espèce mentionnée sous le nom de

*Laboratoire de Zoologie (Arthropodes), Muséum national d'Histoire naturelle, 61, rue de Buffon, 75005 Paris et Laboratoire de Zoologie (Morphologie et Écologie) de l'Université de Montpellier II, place E. Bataillon, 34060 Montpellier Cedex.

Mygale brunnea Latreille, 1818, est un *nomen nudum* (P. BONNET, 1945-1961) ne correspondant à rien de précis et qu'il ne faut pas confondre avec *Mygale brunnea* Nicolet, 1849, qui est une authentique *Mygale* du Chili.

L'autre *Mygale* est une Barychelidae appartenant à un genre endémique *Tigidia* : *Tigidia mauritiana* Simon, 1892. On ne connaît qu'un seul spécimen de cette espèce, le type, qui se trouve dans les collections SIMON du Muséum national d'Histoire naturelle de Paris. Une autre Barychelidae est signalée des Séchelles : *Sason seychellanus* Simon, 1897. Le genre *Sason* a des représentants dans la région indo-malaise et diffère nettement du genre *Tigidia* (P. L. G. BENOIT, 1965).

Il serait vain de vouloir épiloguer sur de si maigres données : on ne connaît rien de la biologie de *Tigidia mauritiana* (qui fort vraisemblablement creuse un terrier). Cependant, l'étude des Mygales et plus spécialement des Barychelidae mériterait d'être réalisée car ce sont de bons indicateurs biogéographiques, bien représentés en Afrique et à Madagascar.

ULOBORIDAE

Trois Uloboridae sont signalées des Mascareignes : *Uloborus geniculatus* (Olivier, 1789), *Uloborus vanillarum* Vinson, 1863, *Uloborus aureus* Vinson, 1863.

La première espèce (*U. geniculatus*) ne présente qu'un intérêt biogéographique restreint car c'est une espèce pantropicale qui marque une certaine préférence pour les lieux habités. La seconde espèce (*U. vanillarum*) n'est connue que de l'île Maurice et de la Réunion : c'est une petite Araignée de 4 à 5 millimètres de long, de couleur fauve ; elle tisse une toile fine et lâche entre les gousses et les feuilles de vanilliers (A. VINSON, 1863). Deux autres Ulobores ont été décrites par A. VINSON (1863) : *Uloborus borbonicus* et *U. aureus*. La première, *U. borbonicus*, est synonyme d'*U. geniculatus*. *U. aureus* est une bonne espèce dont seule la femelle est décrite comme une petite Araignée de 5 à 6 millimètres, de couleur chamois ; le mâle est inconnu.

On connaît deux Uloboridae des îles Séchelles, *U. geniculatus* et *U. luteolus* (Blackwall, 1865) ; cette dernière espèce a été également signalée aux îles du Cap Vert. Elle semble manquer à Madagascar et aux Mascareignes.

SICARIDAE

Plusieurs Seytodes sont signalées des Mascareignes ; une seule est sûre, il s'agit de *Scytodes velutina* Hein. et Lowe, 1835, décrite par A. VINSON, sous le nom de *S. amarantea*. Cette Araignée se rencontre également aux îles Séchelles, dans toute l'Afrique et dans le bassin méditerranéen ; curieusement cette espèce n'est pas signalée de Madagascar. *Scytodes thoracica* (Latreille, 1802) signalée par VINSON des Mascareignes semble être en fait *S. major* Simon, 1885, mais cette assignation est douteuse, alors que A. BUTLER (1879) signale l'espèce *S. thoracica* sur Rodriguez.

Les îles Séchelles présentent deux espèces : *Scytodes perimensis* (Simon, 1890) et *Scytodes pholcoides* Simon, 1898.

La première forme se rencontre également en Arabie et semble avoir été importée alors que la seconde (*S. pholcoides*) est une forme endémique.

PHOLCIDAE

Deux espèces de Pholcidae sont signalées des îles Mascareignes : *Smeringopus elongatus* (Vinson, 1863) et *Artema mauritiana* Walekenaer, 1837. La première espèce, *S. elongatus*, est signalée de la Réunion et semblerait absente de l'île Maurice, ce qui paraît fort surprenant car elle est connue de Madagascar, des Séchelles, de l'Afrique orientale et des Antilles. *A. mauritiana* est une espèce originellement décrite de l'île Maurice qui lui a donné son nom, mais depuis elle a été retrouvée en Afrique centrale, Abyssinie, Madagascar et Séchelles, en Indes et en Chine ainsi que dans de nombreuses îles du Pacifique.

Aux îles Séchelles existe une espèce endémique de Pholcidae : *Holocnemus culiculus* Simon, 1897.

AGELLENIDAE

Aucune Agelenidae n'a jusqu'ici été signalée de l'île Maurice et l'espèce *Agelena borbonica* Vinson, 1863, est propre à la Réunion. C'est une Araignée de 12 à 13 millimètres, de couleur jaunâtre, tissant une toile en nappe avec une retraite cylindrique. Elle ne se rencontre que dans les localités froides (régions centrales élevées) de l'île. Cette écologie est conforme à ce que l'on connaît des Agelenidae de l'océan Indien où elles ne sont présentes à Madagascar que par des formes marines (genre *Desis*) alors que plus au sud, donc dans des contrées plus froides, elles forment la totalité du peuplement aranéidologique des îles Kerguelen avec le genre *Myro*.

OXYOPIDAE

Seules deux Oxyopidae sont signalées des îles Mascareignes : *Peucetia lucasi* (Vinson, 1863) et *Oxyopes dumonti* (Vinson, 1863). La première espèce se rencontre également à Madagascar et en Afrique australe, la seconde (*O. dumonti*) manque à l'île Maurice mais est signalée de Madagascar, des îles Séchelles et de la côte somalienne.

PISAURIDAE

On connaît deux Pisauridae des Mascareignes, l'une endémique à la Réunion : *Hygropoda borbonica* (Vinson, 1863) et l'autre endémique à l'île Maurice : *Ischalea longiceps* Simon, 1898.

L'espèce réunionnaise est d'assez grande taille et ses mœurs la rapprochent des *Dolomedes* des régions tempérées : c'est une Araignée aimant l'humidité et qui se tient toujours à proximité d'étendues d'eau douce, sur lesquelles elle se déplace avec rapidité. Le genre *Hygropoda* est pantropical : Afrique centrale, Madagascar, Réunion, Indes, Malaisie, Birmanie, Indonésie, Moluques, Sumatra, Nouvelle Guinée, Équateur, Venezuela.

L'espèce mauricienne est de taille plus faible, comme toutes les *Ischalea*, l'abdomen

est relativement long et cylindrique. Le genre présente une répartition extrêmement intéressante avec une espèce à Madagascar, *I. incerta* (O. P. Cambridge, 1877) une à l'île Maurice, *I. longiceps*, et une autre en Nouvelle Zélande, *I. spinipes* L. Koch, 1872.

LYCOSIDAE

Deux Lyeosidae sont signalées de la Réunion, *Lycosa nigra* Vinson, 1863, et *Lycosa salaziana* Vinson, 1863, aucune de l'île Maurice ce qui paraît fort surprenant.

Aux îles Séchelles se rencontre *Trochosa urbana* O. P. Cambridge, 1886, espèce trouvée également à Madagascar.

TETRAGNATHIDAE

Bien que la famille soit bien représentée en Afrique et à Madagascar, les *Tetragnatha* n'ont pas encore été signalées de l'île de la Réunion. Il en existe cependant deux espèces à l'île Maurice : *Tetragnatha nitens* (Sav. et Audoin., 1825) à très vaste répartition et *Tetragnatha protensa* Walck., 1841, connue de Madagascar, de l'île Maurice, d'Australie et de Polynésie.

Il est extrêmement intéressant de constater la diversité des espèces de *Tetragnatha* dans les îles Séchelles avec trois espèces endémiques (*Tetragnatha foliifera* Simon, 1898 ; *T. nigrigularis* Simon, 1898 ; *T. modesta* Hirst, 1911) et une quatrième forme (*T. mandibulata* Walck., 1841) absente des Mascareignes mais signalée d'Afrique centrale, d'Asie et de Polynésie.

ARANEIDAE (= ARGIOPIDAE)

Ces grandes Araignées sont généralement très visibles grâce à leur toile géométrique et de ce fait sont régulièrement récoltées même par les non-spécialistes ; en fait, on en connaît dix-huit espèces que l'on peut répartir en trois groupes : celles qui sont communes à l'île Maurice et à la Réunion, celles qui sont propres à l'île Maurice et celles qui ne sont signalées que de la Réunion.

1 — Araneidae signalées des Mascareignes

Leucauge undulata (Vinson, 1863) : espèce de taille moyenne également connue d'Abysinie, d'Afrique orientale et de Madagascar,

Cyrtophora citricola (Forskoel, 1775) : Araignée pantropicale,

Argiope trifasciata (Forskoel, 1775) : espèce présentant une très vaste répartition,

Nephylengis borbonica borbonica (Vinson, 1863) : propre aux îles Mascareignes,

Nephila cruentata (Fabr., 1775) : également présente aux Séchelles,

Nephila inaurata inaurata (Walckenaer, 1891) : propre aux Mascareignes,

Nephila inaurata inaurata var. *nigra* (Vinson, 1863) : connue de Madagascar,

Araneus theisi (Walckenaer, 1841) : espèce pratiquement pantropicale ; elle a été décrite par A. VINSON (1863) sous le nom d'*Epeira assidua*,

Araneus lugubris (Walekenaer, 1841) : espèce présentant une très vaste répartition,
Araneus isabella (Vinson, 1863) : espèce propre à la Réunion et à l'île Maurice,
Cyclosa sanctibenedicti (Vinson, 1863) : propre aux Mascareignes,
Arachnura scorpionoides Vinson, 1863. Cette intéressante Araignée est commune aux deux îles (Maurice et la Réunion) ; on la connaît également de l'Afrique tropicale et de Madagascar. Le genre *Arachnura* est un genre à affinités nettement orientales. Ses huit autres espèces ont une répartition géographique des plus intéressantes : *A. caudata* (Bradley, 1878) d'Australie et Malaisie ; *A. feredayi* (L. Koeh, 1872), Nouvelle Zélande et Tasmanie ; *A. higginsii* (L. Koeh, 1872), Australie ; *A. melanura* Simon, 1867, Malaisie ; *A. pygmaea* (Thorell, 1890), Sumatra ; *A. quinquapicata* Strand, 1911, Nouvelle Guinée et *A. simoni* Berland, 1924, Nouvelle Calédonie.

2 — Araneidae propres à l'île Maurice

Poltys kochi Keyserling, 1864 : espèce signalée de l'île Maurice et de Madagascar,
Leucauge thorelli (Blackwall, 1877) : signalée de l'île Maurice et des Séchelles,
Cyrtarachne grubei (Keyserling, 1864) : endémique à l'île Maurice,
Gasteracantha rhomboidea rhomboidea Guérin, 1838 : également endémique à l'île Maurice.

3 — Araneidae propres à l'île de la Réunion

Argiope australis (Walc., 1841) : signalée d'Afrique australe et de la Réunion, mais n'a été rencontrée ni à l'île Maurice ni à Madagascar,
Araneus slateri (Butler, 1879) : endémique à la Réunion,
Gasteracantha alba (Vinson, 1863) : propre à la Réunion,
Gasteracantha brevispina (Dolleschall, 1857) : endémique à la Réunion.

Le nombre d'espèces est très limité ; il ne fait aucun doute que d'autres Argiopidae seront trouvées aux Mascareignes dans le futur. Cependant cette liste appelle quelques commentaires : deux espèces seulement sont endémiques aux Mascareignes : *Araneus isabella* et *Cyclosa sanctibenedicti* ; elles ne sont pas parvenues aux Séchelles ni à Madagascar. Le cas des Gastéracanthes est curieux : l'île Maurice a son endémique : *G. rhomboidea rhomboidea*, alors que deux espèces sont propres à la Réunion : *G. alba* et *G. brevispina*. Aucune de ces Gastéracanthes, au sens strict, n'existe à Madagascar (M. EMERIT, 1974). Il semble que pour toutes ces espèces endémiques nous ayons affaire à des populations stabilisées à partir d'un très petit nombre de fondateurs. On peut penser, en effet, que toutes ces Araignées fileuses sont facilement déplacées par les courants aériens ce qui explique l'explosion de petits taxons insulaires à partir d'espèces pionnières.

LINYPHIIDAE

Une seule Linyphiidae est connue de l'île de la Réunion et aucune de l'île Maurice ; il s'agit de *Thwaitesia inaurata* (Vinson, 1863) qui est endémique. Le genre *Thwaitesia* a une très vaste répartition, on le rencontre en Amérique, en Afrique, à Madagascar et en Asie.

Jusqu'ici, une seule Linyphiidae est connue des Séchelles ; il s'agit d'une espèce endémique : *Nesticus sechellanus* Simon, 1897.

THERIDIIDAE

Pour la famille des Theridiidae, seul le genre *Argyrodes* est signalé comme présent aux Mascareignes ; *Argyrodes zonatus* (Walck., 1841) est une espèce inféodée aux toiles d'autres Araignées, surtout les grandes Araneidae. L'espèce est connue de l'île Maurice et de la Réunion, son aire d'extension englobe l'Afrique, Madagascar et l'Inde. *Argyrodes gibbosus* (Lucas, 1846) était connue de Madagascar et de l'île Rodriguez ; je l'ai trouvée dans les collections du Mauritius Institute. Son mode de vie est identique à celui de *A. zonatus* ; d'ailleurs, A. VINSON (1863) signale cette dernière espèce, sous le nom de *Linyphia argyrodes*, comme fréquente à la Réunion et à l'île Maurice. *Argyrodes viridis* (Vinson, 1863) est endémique à la Réunion ; son mode de vie diffère semble-t-il de celui des autres *Argyrodes* en ce sens que cette Araignée n'est pas inféodée à d'autres toiles d'Araignées.

Latrodectus menavodi Vinson, 1863, est signalée de l'île Rodriguez mais n'a jamais été trouvée aux autres Mascareignes, bien que l'espèce soit fréquente à Madagascar ; il en est de même de l'ubiquiste *Latrodectus geometricus* (L. Koch, 1841) absente des autres Mascareignes mais présente en Afrique et à Madagascar.

Theridion diurnum Vinson, 1863, se rencontre à la Réunion ainsi qu'à Rodriguez et Madagascar. Par contre, *Theridion rufipes* Lucas, 1846, est signalée de l'île Maurice et de Madagascar ; c'est une espèce à très vaste répartition.

Les îles Séchelles présentent une relative richesse en espèces de Theridiides, dont aucune ne se retrouve aux Mascareignes : *Argyrodes cognatus* (Blackwall, 1877) ; *A. rosstratus* Blackw., 1877 ; *Theridion braueri* Simon, 1898 ; *T. leve* Blackw., 1877 ; *T. placens* Blackw., 1877.

DRASSIDAE

La faune des Drassidae est peu connue ; une seule espèce endémique est signalée de la Réunion, il s'agit de *Drassodes maillardi* (Vinson, 1863) ; on ne la rencontre pas à l'île Maurice d'où jusqu'à plus ample information les Drassidae sont absentes.

Une espèce, *Microdrassus inaudax* (Simon, 1898), est signalée des Séchelles.

CLUBIONIDAE

Une seule espèce de Clubionides a été décrite de l'île Maurice : *Cartenorius fuscus* Simon, 1896, qui y est endémique. Cependant, ce genre renferme trois espèces : celle de l'île Maurice ainsi qu'une espèce malgache et une africaine décrite de la Sierra Leone.

Une espèce de Clubionidae (*Clubiona nigromaculosa* Blackwall, 1877) se rencontre aux Séchelles.

SELENOPIDAE

Aucune Selenopidae n'a été répertoriée des Mascareignes ; à signaler une espèce endémique *Selenops secretus* Hirst, 1911, aux îles Séchelles.

SPARASSIDAE

Deux espèces de Sparassidae sont communes à l'île de la Réunion et à l'île Maurice. Il s'agit de *Sparassus lamarki* (Latreille, 1806) et de l'ubiquiste *Heteropoda venatoria* (Lin., 1758).

S. lamarki a une vaste répartition africaine puisqu'on la rencontre jusqu'au Sénégal ; par contre, elle est absente de Madagascar.

Une espèce, *Olios albifrons* Lucas, 1852, est propre à l'île de la Réunion.

Aux Séchelles, on recense présentement cinq espèces endémiques : *Thomasettia seychellana* Hirst, 1911 ; *Rhacocnemis elegans* Hirst, 1911 ; *R. guttata* (Blackw., 1877) ; *Rhitymna valida* (Blackw., 1877) (le genre *Rhitymna* est présent en Afrique et à Madagascar) ; *Pleorotus braueri* Simon, 1898.

Quant à *Sparassus walckenaeri* (Sav. et Audoin, 1825), signalé des Séchelles, c'est une forme africaine.

THOMISIDAE

Les Thomises présentent un très haut taux d'endémisme, avec quatre espèces propres à l'île Maurice : *Prepotelus lanceolatus* Simon, 1898 (genre endémique !) ; *Stephanopsis limbata* Simon, 1898 ; *Stephanopsis pectinitarsis* Simon, 1898 ; *Misumena alluaudi* Simon, 1897 (le genre *Misumena* est très répandu).

Une Thomise est signalée de la Réunion : *Phrynarachne rugosa* (Walck. in Latreille, 1819) ; cette espèce, absente de l'île Maurice, se rencontre à Madagascar et en Afrique.

Une espèce est endémique sur l'île Rodriguez : *Tmarus vexillifer* (Butler, 1876), alors que deux autres espèces, *Synaema insulare* (Blackw., 1877) et *Firmicus marginatus* Simon, 1898, ne se rencontrent qu'aux Séchelles.

SALTICIDAE

Les Salticidés sont un peu plus nombreuses que les Thomises. Une espèce, *Hasarius adansoni* (Sav. et Audoin, 1825), se rencontre à l'île Maurice, à la Réunion, à l'île Rodriguez et à Madagascar ; sa répartition est très vaste car on la connaît également de l'Afrique et de l'Asie. *Epocilla mauritiana* Simon, 1901, est endémique à l'île Maurice ; le genre est d'affinité typiquement orientale avec des représentants en Inde, Sumatra, Birmanie, Chine et Himalaya. *Heliophanus mauritanus* Simon, 1901, est propre à l'île Maurice, tout comme *Attus ocellus* Walck., 1837, *Cyrapes canosus* Simon, 1900, et *Pseudemathis trifida* Simon, 1902, l'endémisme étant générique dans ce dernier cas.

À l'île de la Réunion quatre espèces sont endémiques : *Hyllus lugubris* (Vinson, 1863), *Attus alboculatus* Vinson, 1863 (l'espèce est considérée comme douteuse), *Attus variabilis* Vinson, 1863, *Beata lineata* (Vinson, 1863) (le genre *Beata* est intéressant car la plupart des espèces appartenant à ce genre sont néotropicales).

Quant aux îles Séchelles, elles renferment des représentants du genre *Myrmarachne* et des espèces propres : *Baviola braueri* Simon, 1897 ; *Baviola tenuimana* (Simon, 1893) ;

Heliophanus activus (Blackwall, 1877); *Hispo striolata* Simon, 1897; *Cynapes wrighti* (Blackwall, 1877); *Salpesia soricina* Simon, 1901 (à noter que les autres espèces du genre *Salpesia* sont toutes australiennes); *Salticus acutus* Blackwall, 1877.

Notons enfin la présence d'une espèce endémique sur l'île Rodriguez : *Cynapes baptizatus* (Butler, 1876).

Cette liste, obligatoirement incomplète, nécessite quelques commentaires.

Il convient de souligner tout d'abord le faible nombre d'espèces recensées aux îles Mascareignes : une soixantaine, ce qui est bien peu comparé à la richesse des continents voisins. Ce fait, à mon sens, n'est pas dû à la raréfaction des Araignées sur ces îles mais bien au manque de récoltes. En fait, un seul arachnologue a prospecté ces îles, il s'agit du Dr A. VINSON, authentique pionnier de l'arachnologie dans cette partie de l'océan Indien ; ses captures ont permis, il y a déjà un siècle, de faire connaître la majorité des espèces actuellement répertoriées. On peut dire que, depuis 1900, aucun arachnologue n'a pu réaliser de captures systématiques sur ces îles. La dernière description d'une espèce des Mascareignes (*Pseudemathis trifida*) date de 1902 et est due à E. SIMON ; les dernières descriptions d'espèces des Séchelles (*Selenops secretus* et *Tetragnatha modesta*) datent de 1911 et sont dues à S. HIRST. Aussi, devant cette lacune, nous paraît-il prématuré de vouloir utiliser les Araignées de ces contrées dans un raisonnement biogéographique quelconque (taux d'endémisme, affinités orientales ou africaines). Il faut attendre que des prospections systématiques, suivies de déterminations, soient réalisées dans l'ensemble de l'océan Indien.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Pour toutes les références bibliographiques antérieures à 1940 voir : P. BONNET (1945-1961), Bibliographia Araneorum. T. I, II, et III, Douladoure, Toulouse.

BENOIT, P. L. G., 1962. — Les Araneidae. Nephilinae africaines. *Revue Zool. Bot. afr.*, **65** (3-4) : 217-231.

— 1963. — Araneidae — Nephilinae du Zoologisches Staats-Institut und Zoologisches Museum Hamburg (Araneae). *Ent. Mitt. zool. StInst. zool. Mus. Hamb.*, **41** : 367-372.

— 1964. — La distribution géographique des Araneidae — Nephilinae africano-malgaches des genres *Nephila* Leach et *Nephilengys* Koch. *Revue Zool. Bot. afr.*, **69**, (3-4) : 311-326.

— 1965. — Les Barychelidae — Diplotelinae africains et malgaches (Araneae — Orthognatha). *Revue Zool. Bot. afr.*, **72** : 25-40.

CANARD, A., 1975. — Stations africaines d'Araignées des genres *Nephila* Leach et *Nephilengys* Koch (Araneae, Argiopidae) d'après les collections du Muséum national d'Histoire naturelle. *Bull. Mus. natn. Hist. nat., Paris*, 3^e série, n° 306, Zool. 216 : 775-782.

EMERIT, M., 1974. — Arachnides, Araignées, Araneidae Gasteracanthinae. In : Faune de Madagascar, 215 p., ORSTOM-CNRS, Paris.

ROEWER, C., 1942-1954. — Katalog der Araneae. T. I, II ; Bremen.

VINSON, A., 1863. — Aranéides des îles de la Réunion, Maurice et Madagascar. Roret, Paris, 337 p.

Manuscrit déposé le 5 décembre 1975.

Bull. Mus. natn. Hist. nat., Paris, 3^e sér., n^o 409, sept.-oct. 1976,
Zoologie 286 : 1131-1139.

Achevé d'imprimer le 28 février 1977.

IMPRIMERIE NATIONALE

6 564 004 5

Recommandations aux auteurs

Les articles à publier doivent être adressés directement au Secrétariat du *Bulletin du Muséum national d'Histoire naturelle*, 57, rue Cuvier, 75005 Paris. Ils seront accompagnés d'un résumé en une ou plusieurs langues. L'adresse du Laboratoire dans lequel le travail a été effectué figurera sur la première page, en note infrapaginale.

Le *texte* doit être dactylographié à double interligne, avec une marge suffisante, recto seulement. Pas de mots en majuscules, pas de soulignages (à l'exception des noms de genres et d'espèces soulignés d'un trait).

Il convient de numérotter les *tableaux* et de leur donner un titre ; les tableaux compliqués devront être préparés de façon à pouvoir être clichés comme une figure.

Les *références bibliographiques* apparaîtront selon les modèles suivants :

BAUCHOT, M.-L., J. DAGET, J.-C. HUREAU et Th. MONOD, 1970. — Le problème des « auteurs secondaires » en taxionomie. *Bull. Mus. Hist. nat., Paris*, 2^e sér., 42 (2) : 301-304.

TINBERGEN, N., 1952. — The study of instinct. Oxford, Clarendon Press, 228 p.

Les *dessins* et *cartes* doivent être faits sur bristol blanc ou calque, à l'encre de chine. Envoyer les originaux. Les *photographies* seront le plus nettes possible, sur papier brillant, et normalement contrastées. L'emplacement des figures sera indiqué dans la marge et les légendes seront regroupées à la fin du texte, sur un feuillet séparé.

Un auteur ne pourra publier plus de 100 pages imprimées par an dans le *Bulletin*, en une ou plusieurs fois.

Une seule épreuve sera envoyée à l'auteur qui devra la retourner dans les quatre jours au Secrétariat, avec son manuscrit. Les « corrections d'auteurs » (modifications ou additions de texte) trop nombreuses, et non justifiées par une information de dernière heure, pourront être facturées aux auteurs.

Ceux-ci recevront gratuitement 50 exemplaires imprimés de leur travail. Ils pourront obtenir à leur frais des fascicules supplémentaires en s'adressant à la Bibliothèque centrale du Muséum : 38, rue Geoffroy-Saint-Hilaire, 75005 Paris.

